

## Progestinici - Iniezione periodica

**Tabella.** Indicazioni comportamentali specifiche, per garantire l'efficacia contraccettiva [2]

CONTRACCETTIVO IN CORSO	INTERVALLO DI UTILIZZO	NECESSITÀ E DURATA DI CONTRACCEZIONE AGGIUNTIVA	ALTRE INFORMAZIONI
Estroprogestinico (E/P) tradizionale	3°-7° giorno di intervallo libero 1°-7° giorno di assunzione	<b>SI</b> 7 giorni	Se rapporto non protetto dopo 3° giorno dell'intervallo libero è raccomandata la ripresa dell'assunzione E/P per almeno 7 giorni
	8°-21° giorno	<b>NO</b>	
	1°-3° giorno di intervallo libero	<b>NO</b>	Consigliato passaggio il 1° giorno di intervallo libero
Pillola progestinica	Qualunque	<b>SI</b> 7 giorni	Consigliata continuazione della pillola progestinica per almeno 7 giorni dopo iniezione
Impianto sottocutaneo progestinico	Entro i termini di durata (3 anni in donne normopeso)	<b>NO</b>	
	Oltre i termini di durata	<b>SI</b> 7 giorni	Considerare contraccezione di emergenza e test di gravidanza dopo almeno 21 giorni da ultimo rapporto non protetto
Dispositivo intrauterino (IUD) a rilascio di progesterone	Entro i termini di durata (3-4- 5 anni secondo il modello)	<b>SI</b> 7 giorni se IUD rimosso prima di iniezione	Consigliata rimozione IUD dopo almeno 7 giorni da iniezione
	Oltre i termini di durata	<b>SI</b> 7 giorni	Considerare contraccezione di emergenza e test di gravidanza dopo almeno 21 giorni da ultimo rapporto non protetto
Metodi barriera o dispositivo intrauterino (IUD) al rame	1°-5° giorno del ciclo	<b>NO</b>	
	Dopo 5° giorno del ciclo	<b>SI</b> 7 giorni	Consigliata rimozione IUD dopo almeno 7 giorni da iniezione

[2] Adattato da CEU clinical guidance: Progestogen-only Injectable, Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare of the Royal College of the Obstetricians and Gynaecologists.