



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

 Regione Emilia-Romagna

لمحلات اي موي

Guida ai controlli



تقويم المواعيد

يوميّات الحمل دليل الفحوصات

عزيزتي السيدة،
إن ولادة أحد الأبناء تعتبر فرصة كبيرة للتغير والنمو بالنسبة للأفراد وللمجتمع.
تفرد كل امرأة وكل رجل وكل زوجين وكل طفل يكشف أساليب لا حصر لها لمواجهة مسار الحمل وحدث الولادة. يتم الحفاظ على ذلك التفرد من خلال وضع الاختيارات الخاصة في مركز الطريق؛ ولهذا تحديداً من الأساسي توفير معلومات سليمة وكاملة وموضوعية حول خيارات المساعدة المحتملة.
والهدف هو توفير معلومات متناسقة ومحدثة حول مسار المساعدة في إيميليا-رومانيا «angamOR-ailimE»، وإتاحة أداة تعاون وتواصل بينك وبين المختصين الذي ستلتقين بهم بصورة من شأنها تسهيل اتخاذ قرارات مناسبة وواضحة.
ملف الحمل يشمل:
«بطاقة الحمل» التي يمكن أن يستخدمها الطبيب أو القابلة من أجل وصف مسار الحمل؛
«يوميّات الحمل» المصممة كدليل يوضح المساعدة المقترحة إليك في كل ثلث من فترة الحمل بعد الآخر.
«نشرات المعلومات» المخصصة كل منها إلى إحدى الموضوعات الخاصة (أساليب الحياة، والدعم أثناء المخاض، والرضاعة الطبيعية، الخ) من أجل تحديد أكثر سهولة للإجابات على الشكوك والارتباكات الأكثر شيوعاً أثناء الحمل وفي الأيام الأولى بعد الولادة.
الخدمة أو الطبيب المرجعي سيضيفون ما يلزم، وذلك من خلال احتمال تسليم بعض الكتيبات الأخرى إليك في حالك حاجتك إلى دعم آخر؛
نشرة «خيارات الولادة» يمكنك استخدامها أثناء الحمل من أجل تسجيل توجهاتك/ رغباتك، ثم تسليمها ومناقشتها في مركز الولادة الذي اخترت الولادة فيه في نهاية الحمل.
قراءة يوميّات الحمل ونشرات المعلومات سيكملها الشرح الذي ستتلقينه أثناء التحاور مع المختصات والمختصين (القابلة، وطبيب النساء، وطبيب الطب العام، وطبيب الأطفال). توجد معلومات أخرى متاحة على المواقع الالكترونية والمنشورات الموزعة التي ستجدينها مذكورة هنا.
يتم توزيع «ملف الحمل» على كافة النساء الحوامل في مراكز الاستشارات الأسرية في الإقليم؛ أيضاً النساء اللاتي يتم دعمهن بصورة خاصة يمكنهن الحصول على نسخة منه لدى مراكز الاستشارات الأسرية الموجودة في منطقتهن السكنية.

تم تنفيذ ملف الحمل مساهمة من مجموعة عمل متعددة التخصصات في اللجنة الإقليمية المختصة بمسار الولادة.

حقوق الطبع محفوظة لإقليم إيميليا-رومانيا «angamOR-ailimE» - كافة الحقوق محفوظة. نسخ هذا المستند كلياً أو جزئياً أو ترجمته مسموح بهما بشرط ذكر المصدر، وألا يتم النشر بهدف الربح أو مصاحبة منتجات تجارية.
الرسوميّات وفهوض الطباعة: نووفيلي «ellevuoN» - طباعة: كاسما تيبوليتو
«otilopiT amsaC»



اباء ارباع	اباء ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع
	اباء ارباع ارباع ارباع	اباء ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع ارباع



ما هي الحقوق أثناء الحمل؟

القانون الإيطالي (المرسوم التشريعي ٢٠٠١/١٥١) يضمن حماية صحة الأم العاملة، وحق الطفل في الدعم المناسب

:السيدة ذات العمل التابع لها الحق في

أذن مدفوعة من أجل إجراء فحوصات ما قبل الولادة، والفحوصات السريرية والكشوفات الطبية التخصصية في حالة وجوب إجرائها أثناء مواعيد العمل؛

عدم فصلها: منع الفصل يسري بدايةً من أول الحمل وحتى إتمام الطفل لعمر سنة؛

عدم إسناد أعمال خطيرة أو شاقة أو غير صحية لها؛

٥ أشهر إلزامية من الامتناع عن العمل (اجازة أمومة) مدفوعة بنسبة ٨٠٪ (في بعض الحالات ١٠٠٪) في الفترة ما بين قبل ولادة الطفل وما بعدها؛
شيكات إعالة الأسرة والإعفاءات الضريبية الممنوحة إلى الزوجين والأبناء المكفولين وأيضًا للسيدات المهاجرات. إذا كانت إيطالية الجنسية يحق لها شيكات إعالة الأسرة أيضًا من أجل الأبناء القاصرين القاطنين في الخارج؛
اجازة أمومة مدفوعة الأجر حتى وإن كانت تعمل بعقد محدد المدة؛

تخفيض ساعات العمل في السنة الأولى من عمر الطفل بالكامل

وكذلك فإن الوالدين صاحبي العمل التابع كليهما لهما الحق في فترة امتناع اختيارية عن العمل (اجازة أبوية) مدفوعة بقيمة ٣٠٪ من الراتب خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل فقط، ويمكن الاستفادة منها فقط بعد فترة الامتناع الإجباري خلال الثمانية سنوات الأولى من عمر الطفل. وهي تحق سواء للأمهات أو للآباء بفترة أقصاها ٦ أشهر (أيضًا متقطعة) للأم، و٧ أشهر (أيضًا متقطعة) للأب

السيدات العاملات في عمل مستقل مقرر لهن منحة أمومة لمدة الشهرين السابقين على تاريخ الولادة ولمدة الثلاثة أشهر التالية على التاريخ نفسه. على أي حال لا يترتب على المنحة وجوب الامتناع عن نشاط العمل المستقل

تأمول عم لأبقت سالا

الاستقبال وتقديم المعلومات

السيدات صاحبات الأعمال غير الاعتيادية وغير المتواصلة واللاتي لا يستفدن من منحة الأمومة أو يستفدن من منحة أقل من حد معين يمكنهن التوجه إلى المعهد القومي للتأمينات الاجتماعية حيث سيُجدن الدعم والمعلومات.

النساء غير العاملات، الإيطاليات أو المنتميات إلى دول الاتحاد الأوروبي أو غير المنتميات إليها ويمتلكن بطاقة إقامة، يمكنهن تقديم طلب من أجل شيك الأمومة لدى مكتب معاون الخدمات الاجتماعية في المدينة التي يقمن بها، أو مقر المعهد القومي للتأمينات الاجتماعية لدى محل إقامتهن خلال ٦ أشهر من ولادة الطفل. السيدات الأجنبية اللاتي لا يمتلكن بطاقة إقامة يمكنهن التوجه إلى مركز الاستشارات وجمعيات العمل التطوعي التي تقدم الاستضافة والمعلومات والدعم دون وجود خطر حدوث إخطار الهدف منه الطرد نظرًا لأن القانون الإيطالي يكفل الدعم الصحي أيضًا للمهاجرين الذين لا يمتلكون مستندات. ويمكنهن تقديم طلب تصريح إقامة للأمومة يسري حتى نهاية الشهر السادس من عمر الطفل

كذلك يقر القانون الإيطالي للسيدة بالحق في الولادة في المستشفى بصورة مجهولة الاسم. يتيح القانون الإيطالي للأم عدم الاعتراف بالطفل وتركه في المستشفى التي ولد بها (مرسوم رئيس الجمهورية ٢٠٠٠/٣٩٦ المادة ٣٠ الفقرة ٢) لكي يتم توفير الدعم وإمكانية التبني والوصاية القانونية عليه

الدعم

معلومات أكثر تفصيلًا @

واكتب "الأمومة والأبوة" في محرك البحث الداخلي، (www.inps.it) لدى المعهد القومي للتأمينات الاجتماعية

ة دعاس م

ثلث من الحمل

مزرعة بول

يتم اقتراح الفحص من أجل التحقق من وجود حمولة بكتيرية مرتفعة في البول (بيلة جرثومية)، وهي في بعض الأحيان لا تسبب أية أعراض. البيلة الجرثومية التي لا أعراض لها تعتبر في المعتاد غير مقلقة، لكن أثناء الحمل يجب تمييزها من أجل البدء في العلاج (فحص من أجل الأمراض المنتقلة جنسياً (المتدثرة والسيلان يُقْتَرَح إجراء الفحص على السيدات اللاتي يوجد لديهن عوامل خطر (انظر الصفحة ٦). في حالة النتيجة الإيجابية يجب البدء على الفور في العلاج بالمضادات الحيوية لتجنب انتقال العدوى إلى الطفل أثناء الولادة

(اختبار لطاخة بابا نيكولاو (مسحة عنق الرحم)

يتم اقتراحه على السيدات البالغات من العمر أكثر من ٢٥ عامًا ولم يقمن بإجراء الفحص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من أجل التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم. إجراء الفحص أثناء الحمل لا ينطوي على خطر الإجهاض ولا ينطوي على مضاعفات أخرى

تخطيط صدى من القابلة

الهدف من تخطيط الصدى في الثلث الأول هو تأريخ موعد الحمل بدقة، والتأكد مما إذا ("كان الأمر يتعلق بحمل توأم (انظر نشرة المعلومات حول "تشخيص ما قبل الولادة

فحص موحد

يشمل الفحص تخطيط صدى وفحص للدم. ويوفر تقدير لخطر إصابة الجنين بمتلازمة داون. يجري خلال الأسبوع الثالث عشر من الحمل (انظر نشرة المعلومات حول "تشخيص ما قبل الولادة

مراقبة الوزن

تعتبر مؤشر على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح. ويتم بالإضافة إلى قياس الطول لتقييم مؤشر كتلة الجسم

مراقبة الضغط

فحص مفيد في تشخيص الإصابة المحتملة بارتفاع الضغط (الضغط المرتفع) الموجود قبل الحمل، وهو يتم دورياً مع كل فحص

كشف طبي من القابلة

يشمل فحص الضغط والوزن وفحص نبض الجنين بالسماعة الطبية (بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل). استكشاف المهبل يتم عند الفحص الأول، ويتم في كل مرة تظهر فيها الحاجة إلى ذلك

فحوصات الدم

فصيلة الدم - عامل البندر

يُنصَح به في الثلث الأول، فهو مفيد من أجل اكتشاف السيدات صاحبات عامل البندر السلبى.

اختبار كومبس غير المباشر

هام في مراقبة السيدات الحوامل صاحبات عامل البندر السلبى. يُنصَح به كافة السيدات أثناء الكشف الطبي الأول، ولاحقاً يتم تكراره في الثلث الثالث

(العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة

هو الاختبار الوحيد المعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل. مطلوب في كل ثلث

من الحمل

سكر الدم

هو الفحص المستخدم من أجل تمييز مرض السكر الموجود قبل الحمل. يُنصَح به في

الكشف الطبي الأول

ناقلات الأمين

فقط في الثلث الأول، وهو يفيد في تمييز السيدات اللاتي يجب أن يُقْتَرَح عليهن اختبار

فيروس الالتهاب الكبدي ج

الهيومولوجوين غير الطبيعي

يتم اقتراح الفحص على كافة السيدات في الثلث الأول من الحمل إذا لم يتم إجرائه قبل

الحمل: يتيح تمييز السيدات السليمات الحاملات لمرض فقر دم حوض البحر الأبيض

المتوسط (بيتا ثلاثيميا)، والأشكال الأخرى من فقر الدم

فحوصات مختصة بالأمراض المعدية

العوز المناعي البشرى

يتم روتينياً اقتراحه في الثلثين الأول والثالث لأنه تم إثبات فعالية العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات لدى السيدات الحوامل الإيجابيات مصلياً

(اختبار روبيو (الحصبة الألمانية

يُنصَح به روتينياً في الثلث الأول، ويجب تكراره في الثلث الثاني في حالة إذا ما كان

("الاختبار الأول سلبياً (انظر نشرة المعلومات "التطعيمات والحمل

(اختبار توكسوبلازما (داء المقوسات

يُنصَح به في الثلث الأول، ويجب تكراره كل ٤٠-٦٠ يوم في حالة السلبية مصلياً. في هذه

الحالة سيتم النصح بتلك السلوكيات المفيدة من أجل الوقاية من العدوى (انظر نشرة

"المعلومات حول "أساليب الحياة أثناء الحمل

فحص من أجل الزهري

يُنصَح به في الثلث الأول، ويجب تكراره في الثلث الثالث. يمكن علاج إصابة الأم عن

طريق علاج مضاد حيوي مخصص، وهو نافع أيضاً في منع انتقال العدوى من الأم إلى

الجنين.

اختبار من أجل فيروس التهاب الكبد ج

يُقْتَرَح إجراء الفحص في الثلث الأول للسيدات اللاتي يوجد لديهن عوامل خطر (انظر

(الصفحة ٦

فحص البول

يفيد من أجل تشخيص بعض الأمراض الموجودة قبل الحمل، ومن أجل تشخيص العدوى البولية أثناء الحمل، واكتشاف الوجود المحتمل للبروتينات في البول. يُنصَح بإجرائه في كل

خلال الثلث الأول**من الأسبوع الأول إلى الثاني عشر**

كل موعد عبارة عن وقت لتبادل المعلومات في إطار "علاقة الرعاية" التي سترافق السيدة أثناء فترة الحمل بالكامل. من المهم أن يجري أول موعد مع الطبيب أو القابلة خلال الأسبوع العاشر من أجل أن يتوافر الوقت لتخطيط أفضل طريقة لدعم الحمل بشكل عام يكون الموعد الأول أطول من تلك المواعيد التالية لأنه من الضروري تجميع المعلومات حول صحة الأم والشريك والأسرة؛ كذلك فهو يعتبر فرصة لتلقي معلومات حول المساعدة والدعم أثناء الحمل، وحول الحقوق القانونية التي تحمي الأمومة والأبوة، وحول دورات المرافقة حتى الولادة، وحول أساليب الحياة، وكيفية إدارة الأعراض الأكثر شيوعاً.

يتم قياس الوزن والضغط الشرياني واقتراح بعض الفحوصات (مذكورة في الصفحة التالية).

بعض السيدات يكون لديهن عوامل خطر خاصة، ويتم أيضاً اقتراح فحوصات أخرى لهن

الاختبار الخاص بفيروس الالتهاب الكبدي ج، على سبيل المثال، يتم اقتراحه على

المرضى اللاتي يخضعن إلى الغسيل الكلوي، ولمن يعشن مع أشخاص مصابين بفيروس

الالتهاب الكبدي ج، ولمن تعاطين مخدرات عن طريق الحقن، الخ؛

الاختبار الخاص بالأمراض المنتقلة جنسياً (المتدثرة والسيلان)، على سبيل المثال، يتم

اقتراحه على من أقامت علاقات جنسية غير محمية مع أكثر من شريك، ومن تعرضت

للعنف، ولمن لها تاريخ في ممارسة الدعارة، ولمن تعاطت الكحوليات والمخدرات، الخ

سيوضح الطبيب أو القابلة سمات الأطفال المصابين بمتلازمة داون وفحوصات التصوير

أو تشخيص ما قبل الولادة المتاحين من أجل تمييزها (انظر نشرة المعلومات حول

"تشخيص ما قبل الولادة"). بشكل خاص

يتم عرض إمكانية إجراء فحص موحد من أجل تقييم احتمالية إصابة الجنين بالمرض؛

يتم تلقي معلومات حول الفحوصات الباضعة لتشخيص ما قبل الولادة: فحص الزغابات

المشيمية (سحب عينة من زغابات الأدمة) وهو ما يتم في الثلث الأول؛ بزل السلى

(سحب عينة من السائل الأمنيوسي) وهو ما يتم في الثلث الثاني

وفي النهاية أثناء كشوفات الحمل سيقدم المختصون، أطباء وقابلات، إلى كافة السيدات

معلومات حول الآثار الضارة للعنف الأسري على الأم والطفل، وإرشادات حول

الخدمات / الجمعيات المحلية التي يمكن إيجاد الدعم والمساعدة فيها (انظر نشرة

"المعلومات" الرخاء النفسي- الجسدي

الضوابط المقترحة

الولادية لدى الجنين، وتقييم تطورها، وتقييم الانحرافات المحتملة في كمية ("السائل الأمنيوسي) انظر نشرة المعلومات حول "تشخيص ما قبل الولادة

مراقبة الوزن

تعتبر مؤشر على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح. يجب أن تكون "زيادة الوزن في الحدود التي يشير إليها الجدول في "بطاقة الحمل

مراقبة الضغط

فحص لا غنى عنه لتشخيص الإصابة المحتملة بارتفاع الضغط الناتج عن الحمل، وهو يتم دورياً مع كل فحص

قياس قاع الرحم - الارتفاق العاني

عبارة عن فحص للتأكد من تقدم نمو الجنين بصورة منتظمة. وهو يتم من خلال القياس باستخدام شريط القياس، أي شريط القياس التقليدي الخاص بالحياسة، للمسافة بين قاع الرحم (أي الحد أعلى البطن) والارتفاق العاني (أي أدنى نقطة من البطن).

فحوصات الدم

(العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة هو الاختبار الوحيد المعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل. مطلوب في كل ثلث من الحمل سكر الدم - منحنى التحمل يتم اقتراح هذا الاختبار على السيدات المعرضات لخطر تطور إصابة بسكر الحمل، على أساس وجود بعض عوامل الخطر (زيادة الوزن أو السمنة المفرطة، الإصابة بسكر الحمل في حمل سابق، وجود تاريخ أسري في الإصابة بالسكر، تجاوز سن ٣٥ سنة، أن تكون المرأة ذات أصل من إحدى دول جنوب آسيا، بشكل خاص الهند وبنجلاديش وباكستان والكاربي والشرق الأوسط). في البداية أثناء الفحص يتم فحص سكر الدم أثناء الصيام من خلال سحب عينة. ثم يتم الدعوة إلى شرب كوب من الماء مُذاب فيه كمية كبيرة من السكر. ثم يتم إعادة فحص سكر الدم بعد ٦٠ إلى ١٢٠ دقيقة. في المجمل يستغرق الفحص ساعتين

فحوصات مختصة بالأمراض المعدية

(اختبار روبيو (الحصبة الألمانية يجب تكراره في الثلث الثاني في حالة النتيجة السلبية (انظر أيضًا ("الفحوصات المقترحة أثناء الثلث الأول (اختبار توكسوبلازما (داء المقوسات "انظر" الفحوصات المقترحة أثناء الثلث الأول

فحص البول

يفيد من أجل تشخيص العدوى البولية أثناء الحمل، واكتشاف الوجود المحتمل للبروتينات في البول. يُنصح بإجرائه في كل ثلث من الحمل

تخطيط صدى هيكل من القابلة

يتم إجراء تخطيط الصدى الهيكل بين الأسبوعين التاسع عشر والحادي والعشرين من الحمل، وهو يفيد في تشخيص احتمال وجود بعض التشوهات

خلال الثلث الثاني

من الأسبوع الثالث عشر إلى السابع والعشرين

أثناء مواعيد هذا الثلث يتم دعوة السيدة إلى وصف حالتها الصحية: الطبيب أو القابلة سيجيبان على الاسئلة وسيوضحان الشكوك، وسيتناقشان في نتائج الفحوصات والمساعدة التي يتم تقديمها في هذا الثلث، مع اقتراح الفحوصات اللازمة

بشكل عام في هذه الفترة

يتم فحص ضغط الدم الشرياني؛

بداية من الأسبوع ٢٤ يتم التحقق من نمو الجنين بصورة مناسبة عن طريق تقييم زيادة حجم الرحم (قياس المسافة بين الارتفاق العاني وقاع الرحم باستخدام شريط قياس)؛

في حالة عدم وجود مناعة سيتم اقتراح إجراء اختبار دم من أجل الحصبة الألمانية والتوكسوبلازما (داء المقوسات)؛

في حالة الوجود في فئة معرضة لخطر الإصابة بالسكر، يتم اقتراح فحص مخصص للدم (منحنى تحمل الجلوكوز)؛

إذا أظهرت فحوصات الدم أن مستوى الهيموجلوبين أقل من ١٠,٥ جم / ١٠٠ مل، قد يتم وصف علاج؛ يتم اقتراح إجراء تخطيط صدى (يُسمى في المعتاد "هيكل") من أجل تشخيص وجود أية انحرافات لدى الجنين، وهو ما يتم بين الأسبوعين ١٩ و ٢١ (انظر نشرة المعلومات حول "تشخيص ما قبل الولادة").

كذلك

يتم توفير معلومات حول دورات المرافقة حتى الولادة (انظر نشرة المعلومات حول دورات المرافقة حتى الولادة)، ويتم البدء في التحدث عن المخاض والولادة (انظر نشرة المعلومات حول "خيارات الولادة")؛

في حالة إجراء أول فحص بعد الأسبو

الضوابط المقترحة

خلال الثلث الثالث

أثناء الكشوفات الطبية، سيجيب الطبيب أو القابلة على الاسئلة وسيوضح الشكوك، وسيعرض نتائج الفحوصات والدعم الممكن اقتراحه بناءً عليها في الشهور الأخيرة من الحمل ومن أجل الولادة كذلك:

يتم فحص الضغط الشرياني، والتحقق من أن الجنين ينمو بصورة مناسبة عن طريق تقييم زيادة حجم الرحم (المسافة بين الارتفاق العاني وقاع الرحم)؛

(يُقترَح إجراء بعض الفحوصات (انظر الصفحة الموجودة بالجانب

في الأسبوع الرابع والثلاثين تقريبًا يتم تخطيط الاتصال مع المستشفى التي ستتم بها الولادة؛ وستلقى السيدات معلومات حول الدعم بعد الولادة، والفحوصات المُقترحة على الفور بعد الولادة، وحول الرضاعة (الطبيعية والعناية بالمولود الجديدة) (انظر نشرات المعلومات في الأسابيع من ٣٢ حتى ٣٤ يتم التحقق من أن الجنين في وضع صحيح من أجل الولادة، أي أنه في وضع المجيء بالرأس أي تتجه رأسه إلى الأسفل: إذا كان الجنين في وضع المجيء بالقدم (الرأس ليست بالأسفل) فإن الطبيب والقابلة سيعطيان معلومات حول إمكانية جعله يستدير (التحويل من خلال مناورات خارجية

عوبس ألمانا ثلثا ناي عربع رأ ناي شرح او ،

فحوصات الدم

اختبار كومبس غير المباشر يُنصَح به كافة السيدات أثناء الكشف الطبي الأول، وفي الثلث الثالث (الأسبوع ٢٨).
(العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة هو الاختبار الوحيد المعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل. مطلوب في كل ثلث من الحمل

فحوصات مختصة بالأمراض المعدية

العوز المناعي البشري يتم روتينيًا اقتراحه في الثلثين الأول والثالث لأنه تم إثبات فعالية العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات لدى السيدات الحوامل الإيجابيات مصليًا (اختبار توكسوبلازما (داء المقوسات "انظر" الفحوصات المقترحة أثناء الثلث الأول فحص من أجل الزهري يُنصَح بإجرائه روتينيًا في الثلث الأول، ويجب تكراره في الثلث الثالث. يمكن علاج إصابة الأم عن طريق علاج مضاد حيوي مخصص، وهو نافع أيضًا في منع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين فيروس الالتهاب الكبدي ب يُنصَح بإجرائه في الثلث الثالث. في حالة إذا ما كانت نتيجة الأم إيجابية توجد علاجات فعالة من أجل منع انتقال العدوى إلى الطفل

فحص البول

يفيد من أجل تشخيص العدوى البولية أثناء الحمل، واكتشاف الوجود المحتمل للبروتينات في البول. يُنصَح بإجرائه في كل ثلث من الحمل

الوقاية المناعية ضد عامل البندر

يتم تقديم هذا العلاج روتينيًا إلى كافة السيدات صاحبات عامل البندر السلبي، واللاقي تكون نتيجة اختبار كومبس لديهن سلبية في الأسبوع ٢٨

المسحة المهبلية

تفيد في تحديد الإصابة بالمكورة العقدية المقيحة المجموعة ب: يتم اقتراح الفحص على كافة السيدات بعد الأسبوع السادس والثلاثين. بالنسبة للسيدات صاحبات النتيجة الإيجابية في الفحص سيقترح الطبيب علاج بالمضاد الحيوي أثناء مخاض الولادة

مراقبة الوزن

تعتبر مؤشر على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح

مراقبة الضغط

فحص لا غنى عنه لتشخيص الإصابة المحتملة بارتفاع الضغط الناتج عن الحمل: يتم روتينيًا مع كل فحص

“Emilia-Romagna” مراكز الولادة في إقليم إيميليا-رومانيا

المحافظة	مركز الولادة	عنوان الاتصال
"PIACENZA" بياتشينسا	في بياتشينسا (GUGLIELMO DA SALICETO) "مستشفى جوليلمو دا ساليتشيتو" "Piacenza"	٣٠١١١ ٠٥٢٣
"PARMA" بارما	"AOSPU OSPEDALI هيئة المستشفيات الجامعية للمستشفيات المتحدة في بارما" RIUNITI di Parma "FIDENZA" مستشفى فيدنسا	٧٠٣١١١ ٠٥٢١ - ٧٠٢١١١ ٠٥٢١ ٥١٥١١١ ٠٥٢٤
	"Borgo Val Di Taro" في بورجو فال دي تارو (SANTA MARIA) "مستشفى سانتا ماريا"	٩٧٠١ ٠٥٢٥
"REGGIO EMILIA" ريدجو إيميليا	"Reggio Emilia" في ريدجو إيميليا (S.MARIA NUOVA) "هيئة مستشفيات سانتا ماريا نووفا" "Guastalla" في جواستالا "مستشفى تشيفيلي" "Montecchio Emilia" في مونتيكيو إيميليا (FRANCHINI) "مستشفى فرانكيني" "Scandiano" في سكانديانو (MAGATI) "مستشفى ماجاتي" "Castelnovo ne' Monti" في كاستيلنوفو ني مونتي (S.ANNA) "مستشفى سانتا أنا"	٢٩٦١١١ ٠٥٢٢ ٨٣٧١١١ ٠٥٢٢ ٨٦٠١١١ ٠٥٢٢ ٣٣٥١١١ ٠٥٢٢ ٦١٧١١١ ٠٥٢٢
"MODENA" مودينا	في مودينا "AOSPU POLICLINICO" هيئة المستشفيات الجامعية المستشفى العام "Modena" "Carpi" في كاري (RAMAZZINI) "مستشفى راماتسيني" "Sassuolo" في ساسولو "مستشفى تشيفيلي" "PAVULLO NEL FRIGNANO" مستشفى بافولو نيل فرينانو "MIRANDOLA" مستشفى ميراندولا	٢١١١ ٤٢٢ ٠٥٩ ٦٥٩١١١ ٠٥٩ ٨٤٦١١١ ٠٥٣٦ ٢٩١١١ ٠٥٣٦ ٦٠٢١١١ ٠٥٣٥
"BOLOGNA" بولونيا	في (S.ORSOLA-MALPIGHI) "هيئة المستشفيات الجامعية سانتا أورسولا-مالبيجي" "Bologna" "Bologna" في بولونيا "MAGGIORE" مستشفى ماججوري في إيمولا (SANTA MARIA DELLA SCALETTA) "مستشفى سانتا ماريا ديلا سكاليتا" "Imola" "BENTIVOGLIO" مستشفى بنتيفوليو	٢١١١ ٦٣٦ ٠٥١ ٦٤٧٨١١١ ٠٥١ ٦٦٣١١١ ٠٥٤٢ ٤١١١ ٦٦٤ ٠٥١
"FERRARA" فيرارا	في (ARCISPEDALE S.ANNA) "هيئة المستشفيات الجامعية مستشفى سانتا أنا الرئيسي" "Ferrara" "Cento" في تشينتو (SS. ANNUNZIATA) "مستشفى سانتيسيمبا أونوسياتا" "Lagosanto" في لاجوسانتو "DEL DELTA" مستشفى ديل دلتا	٢٣٦١١١ ٠٥٣٢ ٨١١١ ٦٨٣ ٠٥١ ٧٢٣١١١ ٠٥٣٣
"RAVENNA" رافينا	"Ravenna" في رافينا (S.MARIA DELLE CROCI) "مستشفى سانتا ماريا ديبي كروتشي" "LUGO" مستشفى لوجو "FAENZA" مستشفى فاينسا	٢٨٥١١١ ٠٥٤٤ ٢١٤١١١ ٠٥٤٥ ٦٠١١١١ ٠٥٤٦
"FORLÌ-CESENA" فوري-تشييزينا	"Cesena" في تشيزينا (M. BUFALINI) "مستشفى إم. بوفاليني" "Forlì" في فوري (G.B. MORGAGNI - L. PIERANTONI) "مستشفى جي. بي. مورجاني - إل. بيرانتوني"	٣٥٢١١١ ٠٥٤٧ ٧٣١١١١ ٠٥٤٣
"RIMINI" ريمينيا	"Rimini" في ريمينيا (INFERMI) "مستشفى إنفرمي"	٧٠٥١١١ ٠٥٤١

