

## Dispositivi intrauterini a rilascio di levonorgestrel (LNG-IUS)

**Tabella.** Indicazioni comportamentali specifiche, per garantire l'efficacia contraccettiva nel passaggio a LNG-IUS da un altro metodo contraccettivo [1]

CONTRACCETTIVO IN CORSO	INTERVALLO DI UTILIZZO	NECESSITÀ E DURATA DI CONTRACCEZIONE AGGIUNTIVA	ALTRE INFORMAZIONI
Estroprogestinico (E/P) tradizionale	Dal 1° giorno di intervallo libero al 7° giorno di assunzione	<b>SI</b> 7 giorni	Consigliata continuazione della pillola E/P per almeno 7 giorni dopo inserimento
	8°-21° giorno	<b>NO</b>	
Pillola progestinica	Qualunque	<b>SI</b> 7 giorni	Consigliata continuazione della pillola progestinica per almeno 7 giorni dopo inserimento
Impianto sottocutaneo progestinico	Entro i termini di durata	<b>NO</b>	
	Oltre i termini di durata	<b>SI</b> 7 giorni	Considerare contraccezione di emergenza e test di gravidanza dopo almeno 21 giorni da ultimo rapporto non protetto
Dispositivo intrauterino al rame (IUD)	Astinenza rapporti nei 7 giorni precedenti	<b>SI</b> 7 giorni	
	Rapporti nei 7 giorni precedenti	<b>SI</b> Mantenere IUD in sede per 7 giorni	Raccomandata astinenza da rapporti nei 7 giorni precedenti la rimozione di IUD
Metodi barriera	1°-5° giorno del ciclo	<b>NO</b>	
	Dopo 5° giorno del ciclo	<b>SI</b> 7 giorni	
	Rapporti nei 7 giorni precedenti	<b>SI</b> Mantenere IUD in sede per 7 giorni	Raccomandata astinenza da rapporti nei 7 giorni precedenti la rimozione di IUS

1] Adattato da Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH). Clinical Guidance: Intrauterine Contraception. Regno Unito, settembre 2019 [<https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceuguidanceintrauterinecontraception/fsrh-guideline-intrauterine-contraception-sep-2019.pdf>]