

Infezione genitale da Chlamydia Raccomandazioni per lo screening

Agenzia produttrice (anno)	Popolazione da sottoporre a screening	Frequenza dello screening
Centers for Disease Control and Prevention (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le donne sessualmente attive ≤ 25 anni o con fattore/i di rischio; in setting ad alta prevalenza, in presenza di risorse, può essere ampliato agli uomini sessualmente attivi ≤ 25 anni - donne in gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - annuale, da ripetere eventualmente in base al rischio individuale - nel primo trimestre in tutte le donne, nel terzo trimestre se presenti fattori di rischio (es. età)
UK Department of Health (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le donne e tutti gli uomini < 25 anni sessualmente attivi o con fattore/i di rischio - stessi criteri per le donne in gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - annuale, da ripetere eventualmente in base al rischio individuale (es. cambio di partner)
Public Health Agency of Canada (2010)	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le donne e tutti gli uomini < 25 anni sessualmente attivi o con fattore/i di rischio - donne in gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - non specificato - nel primo trimestre in tutte le donne, nel terzo trimestre se presenti fattori di rischio (es. età)
Scottish Intercollegiate Guideline Network (2009)	<ul style="list-style-type: none"> - screening in popolazioni e setting a rischio (es. età < 20 anni) - la gravidanza senza altri fattori di rischio non è una indicazione allo screening 	
US Preventive Services Task Force (2007)	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le donne sessualmente attive ≤ 24 anni o con fattore/i di rischio - stessi criteri per le donne in gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - annuale - nel primo trimestre, nel terzo trimestre se permangono fattori di rischio
Victorian Government Department of Human Services (2006)	<ul style="list-style-type: none"> - uomini e donne sessualmente attive < 25 anni o popolazioni a rischio - adolescenti in gravidanza 	<ul style="list-style-type: none"> - annuale - primo trimestre