

Sintomatologia e trattamento della eccessiva o impropria esposizione ad antiparassitari

VELENO	SINTOMATOLOGIA	TRATTAMENTO
Benzene esacloruro Lindano	Irritabilità, stimolazione del SNC, spasmi muscolari, atonia, convulsioni toniche e cloniche, insufficienza respiratoria, edema polmonare	Emesi immediatamente dopo l'ingestione; lavanda gastrica; diazepam per le convulsioni; evitare l'ingestione di oli, che facilitano l'assorbimento; emoperfusione con carbone attivo secondo necessità
Organofosfati Malathion	Nausea, vomito, crampi addominali, scialorrea; aumento delle secrezioni polmonari, cefalea, rinorrea, offuscamento della vista, miosi; difficoltà dell'eloquio, confusione mentale; difficoltà respiratoria, schiuma alla bocca; coma; assorbimento per contatto cutaneo, inalazione o ingestione	Togliere i vestiti, lavare e sciacquare la cute; svuotare lo stomaco; atropina 2mg (adulti), 0,01-0,05mg/ kg (bambini) EV o IM q 15-60min (in assenza di segni di tossicità da atropina, ripetere al bisogno); pralidossima cloruro 1-2g (adulti), 20-40mg/kg (bambini) EV in 15-30min, ripetibile in 1h se necessario; O ₂ ; assistenza respiratoria; correggere la disidratazione. <i>Non usare morfina o aminofillina.</i> Il personale deve evitare l'autocontaminazione
Piretroidi Permethrin Pyrethrin Tetramethrin	Risposta allergica (comprese reazioni anafilattiche e ipersensibilità cutanea) nelle persone ipersensibili; altrimenti, bassa tossicità, a meno che il veicolo non sia un distillato del petrolio	In caso di ingestione di quantità considerevoli, emesi se il paziente è vigile; altrimenti, intubazione endotracheale e lavanda gastrica; lavare accuratamente la cute

Modificata da: Manuale Merck di diagnosi e terapia.
www.msd-italia.com/altre/manuale/tabelle/30703.html